

発疹



すぐお医者さんへ

- 赤い発疹が全身に広がる。
- 水ぶくれができてかゆがる。

▶ 伝染性の感染症の可能性あります。

診療時間にお医者さんへ

- 熱がある。
- 1週間以内にかぜのような症状がおこった発熱とともに発疹がでた。
- 熱が下がると同時に発疹がでた。
- かゆみがあり、やがて水疱になった。
- 首や耳の後ろのリンパ節がはれている。
- のどが痛い。
- 白目の充血や唇の発赤がある。
- 手のひら、足の裏、ひざ、おしり、口の中に水疱がある。
- 2歳以上で両側のほおに蝶形の紅斑こうはんがある。
- 短時間ででたり消えたりする。でる場所が不定。
- 1時間以内に薬を服用した。
- 2〜3日たっても治らない。

発疹をともなう主な子どもの病気

- ・ あせも・湿疹・突発性発疹・とびひ
- ・ 手足口病・リンゴ病・水ぼうそう・はしか
- ・ 風しん・川崎病

発疹がでたときの手当てのしかた

- 症状がなくなっても、お医者さんの許可がでるまでは治療をつづける。
- 発疹をいじったり引っかかないように気をつける。
- 熱がある場合は静かに寝かせて頭を冷やし、湯冷ましなどを飲ませて水分の補給をする。

